

LA LUTTE CONTRE LE CHARANCON DU BANANIER



Charançon adulte



dégâts sur bananier

I Le service proposé par la FDGDON

Le service est proposé aux professionnels agricoles et aux particuliers.

- mise au point d'une méthode de lutte efficace et respectueuse de l'environnement
- fourniture de pièges et de phéromones au démarrage de la lutte, accompagnée d'un appui à la mise en place du dispositif
- réalisation d'un suivi mensuel et d'un accompagnement technique des usagers tout au long de la lutte
- évaluation progressive de l'efficacité du dispositif mis en œuvre
- fiche technique sur la méthode de lutte

I La stratégie de lutte

- opération de lutte collective mise en œuvre auprès des adhérents des GDON
- prophylaxie
- piégeage phéromonal (cosmolure) des adultes mâles et femelles (4 ou 8 pièges/ha). La phéromone est renouvelée tous les mois.
- méthode spécifique de l'organisme nuisible à maîtriser. La phéromone attire le charançon dans un rayon de près de 10 mètres. L'eau savonneuse piège l'adulte.
- piège efficace sur une surface de près de 400 m² à partir du lieu où il est placé.
- aucun produit chimique




piège Costa Rica

I Les résultats de la lutte

- développement de la lutte depuis 2005
- en 2006, 51 piègeurs mobilisés sur l'île et 350 pièges posés et suivis
- grande efficacité : près de 26 500 charançons capturés
- près de 70 ha de bananeraies protégées

Le charançon du bananier est présent dans toutes les bananeraies de l'île !



Zone de présence de bananiers